

PALA PALA 200 EC

PALA PALA 200 EC

PALA PALA 200 EC

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este pesticida envenena através da pele
- Evite qualquer contacto do produto. Use equipamento de protecção como fato macaco, botas de borracha, luvas, mascara própria com filtros novos.
- Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto.
- Não desentupir os bicos com a boca.
- Perigoso para animais, peixes e abelha.
- Não contaminar com restos de produto a agua dos poços e rios.
- Lave o equipamento longe das fontes de agua.
- Guarde todos os pesticidas separados de outros produtos num armazém próprio fechado a chave, em embalagens originais, seguras numa area fresca e seca com boa ventilacao, longe do alcance das crianças.
- Embalagens vazias devem ser inutilizadas e queimadas ou enterrados em lugar seguro longe das fontes de agua, segundo a legislacao em vigor no pais.
- Não armazenar a temperaturas superiores a 38°C por um período longo.
- Nunca utilize as embalagens vazias para guardar agua e alimentos.
- Evite respirar os produtos pulverizados.
- Não aplique contra o vento nem com vento forte.
- Tire e lave a roupa protectora no fim do trabalho. Nunca a leve para casa.

SINTOMAS DE ALARME:

Pode causar irritacao aos olhos e lesionar a cornea. Pode tambem causar irritacao da pele e ate queimadura. Se inalado pode causar lesao nos pulmões.

PRIMEIROS SOCORROS:

No caso de contacto do produto com a pele, lave imediatamente com muita agua, tire a roupa se estiver suja com pesticida.
Se o produto atingir os olhos, lave-os imediatamente com muita agua durante 15 minutos.
Em caso de envenenamento chame o medico e mostre-lhe este rotulo.
Se o paciente estiver inconsciente, nunca faça beber nada, nem induza o vomito. Colocar o paciente inclinado e numa area bem ventilada.

ANTÍDOTO E TRATAMENTO

(Informações para medico):

O tratamento deve ser direccionado ao controlo de sintomas e ao estado clinico do paciente.



SUBSTANCIA ACTIVA

Fluroxypyr 200 g/l

Herbicida sistémico para o controle de arbustos em silvicultura, pastagens, áreas industriais, Cana-de açúcar e Citrinos, .

EMULSAO CONCENTRADA- EC

No REGISTO
DSV - 1599

VOLUME NETO:



Nº Lote:

Data de Fabrico:

Usar antes de:

Agente:

AGROLANDIA
Rua Estevao Ataide no 20
Sommershiel
Tel : + 258 21 498 617
Mail :
agrolandiamoz.@gmail.com
Maputo – Mocambique

Fabricante:

DVA AgroGmbH
Valentinskamp 70

D 20 355 Hamburg
Alemanha

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

DOSAGEM: NUNCA EXCEDER A DOSE RECOMENDADA

Plantas	Dosagem por 100L de agua ou Diesel	Observacoes
Solanum Mauritiano	125 ml (em agua) (0.125 % da msitura por volume)	Aplicacao Foliar: Aplicar em plantas jovens em pleno crescimento activo com mais d 1m de altura: aplicar em cobertura total das folhas e caules.
Solanum mauritiano	1L (em Diesel) (1.0% da msitura por volume)	Tratamento da base do tronco: Assegurar o humedecimento completo de toda a casca da raiz e tronco ate a altura de 0.25m.
Acacia Mearnsii	125 ml (em agua) (0.125% da mistura por volume)	Aplicacao Foliar: Aplicar em plantas jovens em pleno crescimento activo com mais d 1m de altura : aplicar em cobertura total das folhas e caules.
Acacia melanoxyllon		Nota: deve-se acrescentar GAZELA 360 SL à mistura na taxa de0.5%.
Citrinos Ervas perenes,	1/ha ou 300cm3/100 lt de agua	As ervas perenes devem tratar-se entre inicio de floracao e plena floracao quando ha abundante folhagem para uma maior absorcao e transladacao do produto.E conveniente efectuar as aplicacoes quando o solo se encontre humido apos uma irrigacao ou chuva.

PREPARACAO DA CALDA

Colocar agua no pulverizador ate metade, adicionar a quantidade de produto necessario e acrescentar agua ate encher mantendo a agitacao constante.

APLICACAO FOLIAR

- Aplicar nas folhas e caule em cobertura total
- A chuva que ocorre depois da aplicacao nao tem efeito na eficacia do produto desde que as plantas tenham secado apos a aplicacao
- Nao aplicar em folhas humidas
- Evitar pulverizar em plantas nao alvo
- Utilizar um pulverizador de dorso com o bico de cone solido, que ira garantir uma cobertura uniforme na area do alvo. Manter uma pressao constante entre 200 e 300 kPa.

TRATAMENTO DA CASCA BASAL DO TRONCO: para plantas com diametro do caule superior a 10cm.

- Nao aplique a mistura Diesel para hastes se a superficie estiver molhada de chuva ou orvalho.
- Aplicar por meio de pincel, pulverizar em baixa pressao usando angulo estreito com bico de cone solido. Aplicar na area basal do caule ou tronco da planta, desde o nivel do solo ate a altura de 0.25m, assim como em raizes expostas. Para melhores resultados, garantir que toda volta do caule é tratada e bem humedecida. Casas de caules velhos ou rugosos podem precisar de mais calda que as cascas novas e lisas. Em caso de plantas com multiplos caules, este devem ser tratados separadamente.

NATUREZA DO RISCO

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer devido ao armazenamento ou emprego desapropriado do produto.



