


HIPPO™ 480 EC

HERBICIDE



Nº registo: DSV -1596

**SUBSTANCIA ACTIVA - Triclopyr butoxy ethyl ester 480 g/litro
CONCENTRADO PARA EMULSÃO (EC)**

Herbicida sitemico para o controlo de plantas (arvores) silvestres, ervas florestais, campim do pastoreiro, areas industriais, Cana de acuca, Citrinos, Aveia, Cevado, Centeio, Trigo e Cebola.

MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

Volume neto:

20 ltr



DVA

GO FURTHER. TOGETHER

Fabricante:

DVA Agro GmbH
Valentinskamp 70
D 20355 - Hamburg
Alemanha

Nº Lote:

Data de Fabrico:

Usar antes de:

Agente:

AGROLANDIA
Rua Estevao Ataide no 20
Sommershiel

Tel : + 258 21 498 617

Mail: agrolandiamoz@gmail.com

Maputo - Mocambique



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este pesticida envenena através da pele
- Evite qualquer contacto do produto. Use equipamento de protecção como fato macaco, botas de borracha, luvas, máscara própria com filtros novos.
- Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto.
- Não desentupir os bicos com a boca.
- Perigoso para animais, peixes, abelha.
- Não contaminar com restos de produto a água dos poços e rios.
- Lave o equipamento longe das fontes de água.
- Guarde todos os pesticidas separados de outros produtos num armazém próprio fechado a chave.
- Nunca utilize as embalagens vazias para guardar água e alimentos.
- Evite respirar os produtos pulverizados.
- Não aplique contra o vento nem com vento forte.
- Tire e lave a roupa protectora no fim do trabalho.
- Faça a tripla lavagem das embalagens vazias e depois fure-as, destrua-as e enterre em local seguro e longe de fontes de água.

SINTOMAS DE ALARME:

Fraqueza, dores de cabeça, aperto do peito, visão turva, pupilas não reactivas, salvação abundante, suores, náuseas, vômitos, diarreias e cólicas abdominais.

PRIMEIROS SOCORROS:

No caso de contacto do produto com a pele, lave imediatamente com muita água, tire a roupa se estive suja com pesticida.

Se o produto atingir os olhos, lave-os imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos.

Se o produto for engolido, faça vomitar imediatamente, dando de beber água morna e introduzindo um dedo na garganta. Repita até o vomito sair claro.

NUNCA FAÇA BEBER NADA A UMA PESSOA INCOSCIENTE

Colocar o paciente ao ar livre para repouso.

Em caso de envenenamento chame o medico e mostre-lhe este rotulo.

ANTÍDOTO E TRATAMENTO

(Informações para medico):

Não há tratamento específico. Fazer tratamento sintomático

INSTRUÇÕES DE USO:

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

Aplicar o produto diluido em agua, segundo quantidade requerida, aplicando-se a calda sobre a folhagem das plantas. Agitar de forma adequada enquanto se realiza o enchimento, a mistura ea aplicacao. Deve ser aplicado no mesmo dia que foi preparado.

Modo de aplicacao:

Hippo 480 EC deve ser na forma de pulverizacao com equipamentos terrestres (pulverizadores dorsais, motorizadas ou tractorizado).

FORMA DE APLICACAO PARA APLICACAO FOLIAR:

Usar somente sobre as plantas em crescimento.

Aplicar cobrindo toda a parte foliar e ramos.

Nao aplicar quando a folhagem esta humida.

Chuvvas depois da aplicacao nao afectam a eficiencia de aplicacao.

Usar pulverizador de dorso com bico conico mantendo sempre a mesma pressao de 200-250 kPa.

PARA APLICACAO NO TROCO:

Aplicar com 12 horas derrube ou corte.

Aplicar usando pulverizador dorsal, humedecendo completamente a parte cortada.

PARA APLICACAO BASAL (para plantas com diametro maior que 10 cm):

Aplicar utilizando um pincel ou um pulverizador de dorso. Aplicar desde a base ate cerca de 25 cm.

COMPATIBILIDADE:

Em cereais é compatível em misturas de tanque com herbicidas.

PREPARACO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da agua necessaria.

Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de agua e agitar bem ate obter uma mistura homogenea. Deitar esta mistura no recipiente. Adicionar o Oleo mineral quando necessario e completar o volume de agua, agitando sempre.

CULTURAS	PLANTA DANINHA	DOSES	OBSERVACOES
Pastagens	<i>(Vernonia polyanthes)</i> <i>(Verninia westiniana)</i> <i>(Eupatorium maximiliani)</i>	Aplicacao com pulverizador costal: Para Vernonia polyanthes e Eupatorium maximiliani : aplicar 0,25/0,5 litros de Fluroxipir 200 DVA em 99,75-99,5 litros de agua. Para Vernonia wetiniana : aplicar 0,5 litros de Fluroxipir 200 DVA em 99,5 litros de agua. Aplicacao com tractor e equipamento de fluxo de ar (Jatao): Aplicar 1,0/2,0 litros de produto/ha para Vernonia polyanthes e Eupatorium maximiliani e 2,0 litros de produto/ha para Vernonia wetiniana misturados em agua suficiente para volume total de 250 a 400L/ha.	Aplicar a calda herbicida sobre a folhagem das plantas ate o ponto de escurrimto. (*)
Aveia	<i>(Ammi majus)</i> <i>(Ammi vishaga)</i> <i>(Silline gallica)</i> <i>(Stellaria media)</i> <i>(Polygonum aviculare)</i> <i>(Polygonum convolvulus)</i> <i>(Helianthus agnus)</i> <i>(Urtica urens)</i>	0,45 / 0,60 L/ha	Em presenca de cruciferas, Capsella brusa-pastoris, Rapistrum rugosum, Brassica campestris e Raphanus sativus é necessario aplicar em mistura com MCPA1-1,5 L/ha ou 2,4D com MCPA1-1,5 L/ha ou 2,4D (EB aos 100%) 0,30 – 0,45 L/ha. A dose varia segundo o tamanho da planta daninha. É muito selectivo para o cultivo desde tres folhas ate a folha bandeira visivel. Aplicado em mistura com MCPA ou 2,4D o periodo tolerante corresponde ao destes herbicidas: desde 3 a 5 folhas ate a deteccao do primeiro nodo de encane.
Cebola	<i>(Lamium amplexicaule)</i> <i>(Senecio spp)</i> <i>(wedelia glauca)</i>	1 L/ha ou 300 cm3 /100 litros de agua	Para controle de Wedelia glauca aplicar desde 3–4 folhas das plantas daninhas ate a floracao. Volume 200–300 litros de agua.
Citros Pomoideas		1 L/ha ou 300 cm3 /100 litros de agua	Para controle de Wedelia glauca a pulverizacao deve dirigir às plantas daninhas evitando que atinja folhas, frutos e talhos verdes dos frutais. As plantas daninhas perenes devem tratar-se entre o inicio de floracao e plena floracao quando ha abundante folhagem para uma maior absorcao e translocacao do produto. É conveniente efectuar as applicacoes quando o solo se encontre humido apos uma irrigacao ou chuva.
Cana-de-acucar	<i>(Sicyos polyacanthus)</i>	5 L/ha + 2 L/ha atrazina 50%	Para tratamento pos-emergente. Recomenda-se tambem como complemento de pre-emergencia com flumetsulam (**)
Barbecho quimico	<i>(Polygonum aviculare)</i> <i>(Polygonum convolvulus)</i> <i>(Convolvulus arvensis)</i> <i>(Helianthus annus)</i> <i>(Alternanthera philoxeroides)</i> <i>(Rumex crispus)</i> <i>(Spaeralecea bonariensis)</i> <i>(Senecio spp)</i> <i>(Glicyne max)</i> <i>(Trifolium repens)</i> <i>(Lotus tenuis)</i> <i>(Melilotus spp)</i> <i>(Portulaccea oleracea)</i> <i>(Vicia spp)</i> <i>(Wadella glauca)</i>	0,30 / 0,45 L/ha	As doses recomendadas para o uso em barbecho quimico devem ir sempre em mistura com uma dose minima de glifosato de 900g de e.a./ha. (2,5 litros de glifosato 48% ou 1,9 L/ha de glisofato 60,8%). Para Trifolium repens recomenda-se o controle durante o barbecho quimico ou em pre-semeia do trigo a dose de 360 cm3/ha em mistura com 3L/ha de glifosato 48% ou 2,25 L/ha de glisofato 60,8%. Para o controle de soja gaucha RG utilizar 360cm3/ha e agregar ademais à mistura 300 cm3 de 2,4D ester.

(*)Para pulverizacao foliar de qualquer tipo:
Epoca quente, com boa pluviosidade, em que as plantas a serem combatidas estejam em intenso processo vegetativo; isto ocorre normalmente de Outubro a Marco. Geralmente uma aplicacao é suficiente, podendo ocorrer a segunda aplicacao quando houver rebrote.
Obs: Para repasse por via foliar, esperar que a rebrota atinja uma superficie foliar equilibrada ou superior ao seu sistema radicular, o suficiente, para absorver uma quantidade de produto que atinja todo o seu sistema radicular.
O grau de controle das plantas infestantes e a sua duracao dependera da dose aplicada, textura do solo, chuvas, grau de infestacao de plantas infestantes e outras condicoes.
(**) Intervalo de seguranca: 150 para cana-de-acucar.

